

绝密 ★ 考试结束前

全国 2020 年 8 月高等教育自学考试  
线性代数试题  
课程代码 :02198

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

说明: 在本卷中,  $A^T$  表示矩阵  $A$  的转置矩阵,  $A^*$  表示矩阵  $A$  的伴随矩阵,  $E$  是单位矩阵,  $|A|$  表示方阵  $A$  的行列式,  $r(A)$  表示矩阵  $A$  的秩。

一、单项选择题: 本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 若行列式  $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & -2 \\ z & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1$ , 则  $\begin{vmatrix} x+2 & y-4 & z-2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} =$

- A. -2      B. -1      C. 1      D. 2

2. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$  的秩为 2, 则

- A.  $a \neq b$  且  $a + 2b = 0$       B.  $a \neq b$  且  $a + 2b \neq 0$   
C.  $a = b$  且  $a + 2b \neq 0$       D.  $a = b$  或  $a + 2b = 0$

3. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 而向量组  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性相关, 则

- A.  $\alpha_1$  必可由  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性表出      B.  $\alpha_2$  必可由  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$  线性表出  
C.  $\alpha_3$  必可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  线性表出      D.  $\alpha_4$  必可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

4. 设 2 阶矩阵  $A$  满足  $|2E + 3A| = 0$ ,  $|E - A| = 0$ , 则  $|A| =$

- A.  $-\frac{3}{2}$       B.  $-\frac{2}{3}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{3}{2}$

5. 设二次型  $f(x_1, x_2) = kx_1^2 + kx_2^2 + 2x_1x_2$  正定, 则数  $k$  的取值范围是

- A.  $k < -1$       B.  $-1 < k < 0$       C.  $0 < k < 1$       D.  $k > 1$

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

6. 已知行列式  $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix}$ , 其代数余子式为  $A_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, 3$ ),

则  $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 行列式  $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 & 0 & 0 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设  $A$  是 3 阶矩阵,  $r(A) = 1$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $r(AB) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设向量组  $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$ ,  $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_4 = (1, 1, 1)^T$  的秩为 3, 则数  $a$  的取值应满足  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

11. 设向量  $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 2, -1)^T$ ,  $(\alpha_1, \alpha_2)$  表示  $\alpha_1$  与  $\alpha_2$  的内积,

则  $\alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1 = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设  $A$  为  $3 \times 4$  矩阵,  $\text{r}(A)=3$ , 若  $\eta_1, \eta_2$  为非齐次线性方程组  $Ax=\beta$  的解且  $\eta_1 \neq \eta_2$ , 则其导出组  $Ax=0$  的通解为  $x=$  \_\_\_\_\_.

13. 若线性方程组  $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + ax_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 8x_3 = 1 \end{cases}$  无解, 则数  $a=$  \_\_\_\_\_.

14. 设 2 阶矩阵  $A$  与  $B$  相似, 若  $A$  的特征值为 -3 和 2, 则  $|B^2|=$  \_\_\_\_\_.

15. 二次型  $f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 4x_1x_2$  经可逆线性变换  $\begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{2}{3}y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$  化为 \_\_\_\_\_.

三、计算题：本大题共 7 小题，每小题 9 分，共 63 分。

16. 计算行列式  $D = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$  的值.

17. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ , 求  $2A^2 + 3A - 4E$ .

18. 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \end{pmatrix}$ , 求  $A^{-1}$ .

19. 求向量组  $\alpha_1 = (1, -1, 2, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 0, 2, 2)^T$ ,  $\alpha_3 = (0, 2, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_4 = (1, 0, 3, 1)^T$ ,  $\alpha_5 = (-1, 5, -1, 2)^T$  的秩和一个极大线性无关组, 并将向量组中的其余向量由该极大线性无关组线性表出.

20. 设 4 元非齐次线性方程组  $Ax=\beta$  的增广矩阵经初等行变换化为

$$(A, \beta) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & c+1 & 0 \end{array} \right)$$

讨论  $a, c$  为何值时方程组有无穷多解并求出其通解 (要求用其一个特解和导出组的基础解系表示).

21. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 试判定  $A$  是否可对角化, 并说明理由.

22. 用正交线性变换化二次型  $f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - 3x_1x_2$  为标准形, 并写出所作的正交线性变换.

四、证明题: 本题 7 分。

23. 设  $A, B, C$  为  $n$  阶矩阵,  $C$  可逆且  $C^{-1} = (C^{-1}B + E)A^T$ . 证明  $A$  可逆且  $A^{-1} = (B + C)^T$ .